



Bulletin mensuel de prévision saisonnière de la Nouvelle-Calédonie

Mars 2025

Prévisions locales pour le trimestre Avril-Mai-Juin 2025

Températures, précipitations

Suivi du phénomène ENSO


Océan superficiel

Océan de subsurface

Précipitations

Southern Oscillation Index

Prévision des modèles



Probabilité de présence des différentes phases d'ENSO
prévues pour le trimestre mars-avril-mai 2025.

Source : C3S multi-system forecast

En bref...


En février 2024, le dipôle chaud / froid des températures océaniques entre l'ouest et l'est du Pacifique tropical reste présent mais s'est sensiblement affaibli, tant en surface qu'en profondeur. L'atmosphère a vu elle aussi tous les signaux relatifs à la présence de La Niña reculer. Bien que l'ensemble de ces marqueurs climatiques indiquent que La Niña est encore présente, ce déclin amorcé en février devrait se poursuivre au cours des mois prochains et il est attendu que des conditions neutres reviennent rapidement au cours du trimestre mars – mai 2025.

Dans ce contexte climatique, une vaste anomalie d'eaux chaudes s'est mise en place au voisinage de la Nouvelle-Calédonie, alimentée à la fois par la présence de La Niña (même si celle-ci est en phase de déclin), mais aussi par le réchauffement climatique d'échelle planétaire. Cette anomalie devrait persister plusieurs mois durant, et pendant tout le premier semestre 2025 au moins. En conséquence, les pluies en Nouvelle-Calédonie devraient être, **en moyenne trimestrielle**, supérieures aux normales de saison pour la période avril-mai-juin 2025 (confiance modérée). Concernant les températures, elles devraient dans ce même contexte, être supérieures aux normales de saison pour ce prochain trimestre (confiance élevée).

Prévisions locales pour le trimestre avril / mai / juin 2025

Dans le contexte d'un épisode La Niña déclinant mais toujours présent, et notamment de températures océaniques élevées à l'ouest du Pacifique équatorial, les pluies devraient être excédentaires pour le trimestre avril-mai-juin 2025 en Nouvelle-Calédonie. Concernant les températures pour ce même trimestre, tirées à la hausse par le réchauffement climatique planétaire qui s'additionne aux effets attendus de La Niña sur notre région, elles devraient être supérieures aux normales de saison avec un très fort indice de confiance.


Précipitations



Tendances pour les précipitations :

Un scénario plus humide est privilégié pour le trimestre avril-mai-juin 2025.

Températures



Tendances pour les températures :

Les températures devraient être supérieures aux normales de saison avec une forte probabilité pour le trimestre avril-mai-juin 2025.

Comprendre les prévisions probabilistes

50%	50 % de probabilité d'être au-dessus des normales (dans le tercile supérieur)
30%	30 % de probabilité d'être proche des normales (dans le tercile médian)
20%	20 % de probabilité d'être en dessous des normales (dans le tercile inférieur)


NB : Les valeurs des normales sont calculées sur la période de référence 1993-2016.



Suivi du phénomène ENSO

Océan superficiel

Décembre / janvier / février 2024-2025



En février, le contraste entre l'anomalie d'eau froide au centre du Pacifique équatorial (zone 2) et l'anomalie chaude à l'ouest du bassin (zone 1) s'est affaibli, traduisant que l'épisode La Niña actuel est entré dans sa phase de déclin.

Au centre du bassin, dans la boîte Niño 3.4, l'anomalie de température des eaux de surface s'est atténuée de 0,3°C en février par rapport au mois précédent. En moyenne sur les 3 derniers mois (déc. – jan. – fév.), cette anomalie vaut -0,6°C (source NOAA).

Figure 1 : Évolution au cours des 3 derniers mois de l'anomalie mensuelle de la température de l'océan superficiel exprimée en °C, par rapport à la période de référence 1993-2016.


Source : MERCATOR OCEAN – SYSTEM FOR GLOBAL OCEAN PHYSICAL ANALYSIS – PSY4V3R2



Suivi du phénomène ENSO

Océan de subsurface

Décembre / janvier / février 2024-2025



En subsurface, bien que l'anomalie d'eau chaude située à l'ouest du bassin Pacifique équatorial (zone 1) se soit renforcée vers 100 mètres de profondeur, l'anomalie d'eau froide située au centre et à l'est du bassin (zone 2) s'est quant à elle sensiblement affaiblie au cours de ce dernier mois, traduisant, en cohérence avec les anomalies de température du surface de l'océan (voir page 3), que La Niña est entré dans sa phase de déclin en février.

Figure 2 : Évolution au cours des 3 derniers mois de l'écart à la normale de la température de l'océan entre 2°N et 2°S pour différentes profondeurs (entre 0 et 500 m) exprimé en °C (période de référence 1993-2016).



Source : MERCATOR OCEAN – SYSTEM FOR GLOBAL OCEAN PHYSICAL ANALYSIS – PSY4V3R2

Suivi du phénomène ENSO

SOI et anomalies de vents

Le SOI 30 jours* (Southern Oscillation Index) est un indice normalisé basé sur la différence de pression atmosphérique mesurée entre Darwin (Australie) et Faa'a (Tahiti). Lorsqu'il atteint +7, cela peut indiquer des conditions favorables à La Niña. A l'inverse, le franchissement du seuil -7 peut indiquer des conditions propices à un événement El Niño. Les valeurs comprises entre -7 et +7 correspondent généralement à des conditions neutres.

* Retrouvez des explications plus complètes en dernière page.



En février 2025, les valeurs du SOI-30 jours ont largement chuté. Au 11 mars, elles atteignent -6,7, ce qui traduit un retour engagé vers des conditions neutres (figure 3).

Concernant les anomalies de vent d'Est, elles ont disparu au centre du bassin (entre 160 et 120°W) par rapports aux deux mois passés et ne persistent encore que sur la moitié ouest du bassin (figure 3-bis). Ce retrait progressif des anomalies de vent d'Est témoigne d'un désaccouplement qui s'amorce entre l'océan et l'atmosphère C'est un signe annonciateur supplémentaire du retrait prochain de La Niña.

Figure 3 : Évolution temporelle de l'indice SOI 30 jours (Southern Oscillation Index) du 1^{er} février 2023 au 11 mars 2025.

Source : Commonwealth of Australia, Bureau of Meteorology.




Figure 3-bis : Anomalies mensuelles des vents de surface (925 hPa) en février 2025 (référence : 1991-2020).

Source : International Research Institute for Climate and Society, Climate Monitoring, NOAA NCEP-NCAR

Suivi du phénomène ENSO

Précipitations - Février 2025

En février, la répartition des pluies sur le Pacifique équatorial reste caractéristique des conditions La Niña sur la moitié ouest et le sud-ouest du bassin : au centre du bassin, entre 150°E et 150°W (zone 1), une zone anormalement sèche reste en place, en adéquation avec les eaux anormalement froides de surface qui y sont présentes, tandis qu'à l'ouest et sur le sud-ouest du bassin, une zone plus pluvieuse que la normale reste présente (zone 2). Dans ce contexte, la ZCPS conserve ce mois-ci encore une position située plus au sud-ouest que d'habitude.

Si l'ensemble de ces signaux traduisent que La Niña est toujours en place, on observe néanmoins ce mois-ci la disparition des anomalies sèches à l'est du Pacifique équatorial, ce qui constitue un signe précurseur supplémentaire du retrait de La Niña.

*ZCPS : Zone de convergence du Pacifique sud. Voir dernière page.




Figure 4 : Anomalies mensuelles des précipitations, en mm/mois en février 2025. (période de référence : 1991-2020).

Source : International Research Institute for Climate and Society, Climate Monitoring.



Suivi du phénomène ENSO

Prévision des modèles pour les mois à venir

Rappel : La température de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4 sert d'indice pour caractériser le cycle d'ENSO. Lorsque, durant 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est supérieure à $+0,5^{\circ}\text{C}$, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode El Niño. Lorsque, sur 3 mois consécutifs, sa moyenne sur les 3 derniers mois y est inférieure à $-0,5^{\circ}\text{C}$, on considère que les conditions océaniques sont significatives d'un épisode La Niña. Lorsqu'elle est comprise entre $-0,5^{\circ}\text{C}$ et $+0,5^{\circ}\text{C}$, les conditions neutres prévalent.

L'anomalie de température de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4 (figure 5) a régressé en février et atteint à présent $-0,5^{\circ}\text{C}$. En moyenne au cours des 3 derniers mois (décembre / janvier / février 2024-2025), cette anomalie de température vaut $-0,6^{\circ}\text{C}$ (source : NOAA). Bien que le phénomène décline rapidement, nous sommes toujours en situation La Niña.





Figure 5 : Variation observée de l'anomalie moyenne mensuelle de la température de surface de la mer au sein de la boîte Niño 3.4 [5°N-5°S ; 170W-120W] au cours des 24 derniers mois. Source : GLORYS - Réanalyse globale réalisée à Mercator Océan – Toulouse.

L'ensemble des modèles climatiques internationaux, dont le modèle ARPEGE S8 de Météo-France (figure 6), s'accordent à prévoir que le bref épisode La Niña, démarré en décembre, a amorcé un rapide déclin, et que des conditions neutres devraient se remettre en place au cours du trimestre mars-mai 2025.



Ref. Mercator-Ocean : Analysis : PSY3V4R2, Climatologie 1993-2016 : GLORYS2V4

Figure 6 : Variation observée (en bleu) et évolutions prévues (en rouge) de l'anomalie moyenne de la température à la surface de la mer au sein de la boîte Niño 3.4 [5°N-5°S ; 170W-120W] par les 41 simulations de Météo-France (modèle Météo-France ARPEGE S8). Source : Météo-France, mars 2025

Légendes et définitions

Bulletin mensuel de prévisions saisonnières

ÉLÉMENTS DE CLIMATOLOGIE :

- **Normales** : on définit des valeurs dites « normales » pour les différents paramètres (température, précipitations...) ; elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles peuvent être définies aux niveaux décennaire, mensuel, saisonnier ou annuel et permettent de mettre en évidence la tendance d'une décennie, d'un mois, d'une saison ou d'une année : mois très arrosé, hiver frais, mois de février chaud, année déficitaire en précipitations.
- **ENSO** : « El Niño Southern Oscillation » désigne les modifications de la circulation atmosphérique dans le Pacifique équatorial ainsi que les anomalies de température de l'océan qui y sont associées. Pour plus d'explications sur les différentes phases de ce phénomène (neutre, El Niño et La Niña), se rendre sur les 3 articles dédiés [Présentation du phénomène](#), [Les différentes phase et leurs conséquences](#) et [La prévision du phénomène](#) sur notre site www.meteo.nc
- **ZCPS** : La zone de convergence du Pacifique sud est une structure nuageuse vectrice de fortes précipitations dans le Pacifique sud-ouest. Pour en savoir davantage, se rendre sur la page « Climat » du site www.meteo.nc, onglet « Climat en Nouvelle-Calédonie ».
- **MJO** : La MJO (Madden Julian Oscillation) est une onde atmosphérique de grande échelle qui se propage d'Ouest en Est le long de l'équateur, depuis l'est de l'Afrique jusqu'au milieu du Pacifique à une vitesse d'environ 500 km/jour. Au passage de cette onde, la convection - et donc les précipitations - se renforcent sensiblement. Le passage de la MJO favorise également le développement des dépressions tropicales et des cyclones. (Pour en savoir plus : [La MJO - Site de Météo-france](#))
- **SOI** : Le SOI (Southern Oscillation Index) est un indice normalisé basé sur la différence de pression atmosphérique mesurée entre Darwin (au nord de l'Australie) et Faaa (Tahiti). En temps « normal », il vaut zéro. Lorsqu'il devient positif, cela signifie que la différence de pression entre Darwin et Faaa augmente, ce qui traduit un renforcement des alizés d'Est équatoriaux. C'est ce même renforcement des alizés équatoriaux qui, quand il s'installe durablement, peut signifier qu'un épisode La Niña est en cours. On considère qu'un épisode La Niña est en place lorsque le SOI atteint durablement des valeurs supérieures ou égales à +7. A l'inverse, des valeurs négatives traduisent un affaiblissement des alizés d'Est équatoriaux et le seuil négatif - 7 sert de référence pour identifier un événement El Niño. Les valeurs comprises entre -7 et +7 correspondent généralement à des conditions neutres.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Cette publication a un but informatif et éducatif. En aucun cas elle ne tient lieu d'attestation. La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de Météo-France.

ÉDITION :

Météo-France
Direction Interrégionale en Nouvelle-Calédonie
et à Wallis-et-Futuna
5 rue Vincent Auriol
BP M2
98849 Nouméa cedex

Directeur de la publication :
Frédéric ATGER

Conception et Réalisation :
Division Climatologie

Tél. : (687) 27 93 14
Fax : (687) 27 93 01
Email : contact.nouvelle-caledonie@meteo.fr
Site internet : <http://www.meteo.nc>