

# BULLETIN DE PRÉVISION SAISONNIÈRE WALLIS-ET-FUTUNA


## DÉCEMBRE 2025

### ENSO (El Niño Southern Oscillation)

#### Situation actuelle

Depuis octobre 2025, le Pacifique tropical connaît des conditions caractéristiques d'une phase La Niña.

Indice océanique relatif Niño 3.4 (RONI) au cours des 24 derniers mois



#### Prévisions d'ENSO

La Niña semble avoir atteint son maximum d'intensité et devrait commencer à décliner. Le retour à des conditions neutres est attendu au cours du premier trimestre 2026.

Probabilités d'occurrence des différentes phases d'ENSO pour le trimestre jan.-fév.-mars 2026

Phase La Niña

30 %



Phase neutre

70 %



Phase El Niño


0 %



# PRÉVISIONS DES PRÉCIPITATIONS POUR LE TRIMESTRE JAN.-FÉV.-MARS 2026

## Dans le Pacifique sud-ouest

### Probabilités de scénario de précipitations



PROGRAMME OF  
THE EUROPEAN UNION




IMPLEMENTED BY



## À Wallis-et-Futuna

Pas de tendance significative concernant les précipitations.

### Probabilités de scénario des précipitations



Remarque : S'agissant de prévisions trimestrielles, cela n'exclut pas la possibilité qu'un mois isolé se comporte différemment de la tendance trimestrielle annoncée.


Pour situer ces prévisions, les normales mensuelles des cumuls de précipitations sur Wallis-et-Futuna sont :

Janvier : 362 mm  
Février : 343 mm  
Mars : 325 mm

# PRÉVISIONS DES TEMPÉRATURES POUR LE TRIMESTRE JAN.-FÉV.-MARS 2026

## Dans le Pacifique sud-ouest


### Probabilités de scénario de température



À Wallis-et-Futuna

Les températures devraient être supérieures aux normales avec une probabilité de 50 %.

### Probabilités de scénario des températures



Remarque : S'agissant de prévisions trimestrielles, cela n'exclut pas la possibilité qu'un mois isolé se comporte différemment de la tendance trimestrielle annoncée.


Pour situer ces prévisions, les normales mensuelles des températures minimales et maximales sur Wallis-et-Futuna sont :

Janvier : 25,1°C / 31,0°C  
Février : 25,1°C / 31,0°C  
Mars : 25,1°C / 31,0°C

# PRÉVISIONS DES VENTS POUR LE TRIMESTRE JAN.-FÉV.-MARS 2026

## Dans le Pacifique sud-ouest


### Probabilités de scénario de vent



### À Wallis-et-Futuna

Le vent devrait souffler avec moins de vigueur qu'habituellement avec une probabilité de 45 %.

### Probabilités de scénario du vent



*Remarque : S'agissant de prévisions trimestrielles, cela n'exclut pas la possibilité qu'un mois isolé se comporte différemment de la tendance trimestrielle annoncée.*

*Pour situer ces prévisions, les normales mensuelles des vitesses de vent sur Wallis sont :*

*Janvier : 11,5 km/h*

*Février : 11,9 km/h*

*Mars : 11,1 km/h*

# DÉFINITIONS

ENSO (« El Niño Southern Oscillation ») désigne les modifications de la circulation atmosphérique dans le Pacifique équatorial ainsi que les anomalies de température de l'océan qui y sont associées. ENSO est la principale source de variabilité interannuelle des précipitations et des températures observée sur le Pacifique Sud durant la saison chaude (entre novembre et avril). Son influence sur le temps est moindre durant le reste de l'année. Pour plus d'explications sur les différentes phases de ce phénomène (neutre, El Niño et La Niña), rendez-vous sur les 3 articles dédiés : [Présentation du phénomène](#), [Les différentes phase et leurs conséquences](#), [La prévision du phénomène](#).

Au-delà d'ENSO, les pluies et les températures à Wallis-et-Futuna sont aussi conditionnées par d'autres facteurs de forçage climatique de plus petite échelle spatio-temporelle, tels que la position de la ZCPS, le passage d'une MJO, le passage d'une perturbation tropicale ou de phénomènes pluvio-orageux. L'ensemble de ces éléments sont pris en compte pour produire des prévisions saisonnières. Les modèles de prévision permettent ainsi d'estimer, sous forme de probabilité, les tendances de pluie, de température, ou encore de vent, à l'échelle des trimestres à venir, et ce en comparaison aux normales de saison.

**Boîte Niño 3.4 :** Pour surveiller l'océan Pacifique et identifier les phases El Niño, La Niña ou neutre, les climatologues utilisent de multiples indicateurs, notamment l'anomalie trimestrielle de la température de surface de l'océan Pacifique dans une zone appelée « boîte Niño 3.4 », qui est un rectangle de coordonnées 5°N/5°S – 120°W/170°W.

**Indice relatif Niño 3.4 (RONI) :** Les différentes phases du phénomène ENSO sont identifiées en suivant l'évolution de la température de surface de la mer dans la boîte Niño 3.4. Jusqu'en 2021, les climatologues utilisaient l'écart de température de surface de la mer dans cette boîte Niño 3.4 par rapport à sa valeur climatologique. Or, cette approche est devenue problématique car, dans le contexte du réchauffement climatique où la climatologie elle-même varie trop vite, elle avait pour effet que les phénomènes El Niño devenaient surestimés, tandis que les phénomènes La Niña étaient sous-estimés. Pour remédier à ce problème, l'indice relatif Niño 3.4 (RONI) a été conçu : il fournit une indication sur l'anomalie de température dans la boîte Niño3.4 par rapport à l'anomalie moyenne de température de l'ensemble de la zone tropicale (20°N/20°S), permettant ainsi de déterminer plus justement les phases d'ENSO en s'affranchissant des effets du réchauffement climatique. Pour en savoir plus sur l'indice RONI : [Defining El Niño indices in a warming climate](#).

**Normales :** On peut définir des valeurs dites «normales » pour différents paramètres météorologiques (température, précipitations, vitesse du vent, etc.) ; ces normales sont obtenues en effectuant la moyenne d'un paramètre considéré sur trente ans. Ces valeurs servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles peuvent être définies aux niveaux décadaire, mensuel, trimestriel ou annuel et permettent de mettre en évidence la tendance d'une décennie, d'un mois, d'un trimestre ou d'une année : mois très arrosé, trimestre frais, année déficitaire en précipitations, etc.

# ÉDITION

Météo-France  
Direction Interrégionale en Nouvelle-Calédonie  
et à Wallis-et-Futuna  
5 rue Vincent Auriol  
BP M2  
98849 Nouméa cedex

Météo-France est certifié ISO 9001

27 93 00  
contact.nouvelle-caledonie@meteo.fr  
<https://www.meteo.nc>

Directeur de la publication : Frédéric ATGER  
Conception et Réalisation : Division Climatologie